

適應，會不自覺地用手去接觸口罩外面或移開口罩，又沒有洗手，常見年老病人，因要尊重病人的選擇及權利，所以強制病人配戴口罩是很難執行。

答題二

當時照顧這位源頭病人的護理人員是有遵守當時飛沫傳染控制措施，按指引穿著個人防護裝備。員工會配戴外科口罩，每次照顧病人後需洗手。如醫護人員與病人有緊密接觸，接觸病人口鼻分泌物、血液、體液，執行引發飛沫散播的高風險程序，需配戴 N95 口罩、穿著保護外袍、戴手套、眼罩或面罩。程序完成後、卸除保護衣物及手套後需立即洗手。清潔員工要用濃度 1000ppm 的漂白水清潔周圍環境及物品。限制探訪者、給予住院病人及探訪者配戴外科口罩。我不能確定 E1 員工受感染的真正原因。大部份被感染的同事有直接照顧或接觸過這位源頭病人，部份同事更有提醒或指導過這源頭病人配戴口罩，這是他們被感染的可能原因，另外是當時該病房的病人很多，病床佔用率在 110% 至 120% 之間，病房內病毒濃度頗高，病毒傳染性又高，亦可能是其中的原因。

答題三

E1 的源頭病人是在 2003 年 3 月 24 日轉往瑪嘉烈醫院

當這位源頭病人轉往瑪嘉烈醫院，護理人員給予病人配戴 N95 口罩時，曾被病人拒絕，經護理人員再次勸喻、解釋後才肯戴上。

運送病人乘搭救護車的支援人員會配戴 N95 口罩、穿著保護外袍、戴手套才運送病人。因病人是 SARS 懷疑個案，故給予及教導病人戴上 N95 口罩。支援人員運送病人交與消防處救護人員，將病人載送到瑪嘉烈醫院，護理人員在召喚救護車時會聲明是傳染性的病人。

書寫報告人



陳潔開

雅麗氏何妙齡那打素醫院內科部部門運作經理

2004 年 1 月 20 日